


แนวทางการคัดกรอง COVID-19 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการที่หน่วยไตเทียม



20 มีนาคม 2563

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการคือ

- 1) มีการเดินทางไปหรือมาจากต่างประเทศ หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด
- 2) เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาด
- 3) มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- 4) มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ประเทศไทยที่มีข้อมูลระบาด



PUI = patients under investigations

แนวทางการฟอกเลือดในผู้ป่วย PUI ที่ผลตรวจ COVID-19 เป็นผลลบ

ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโดยตรง = สัมผัสผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย
ผู้ที่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง = สนทนากับผู้ป่วย แต่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วย
และสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย

ผู้ป่วย PUI ที่ไม่พบสาเหตุ
ของอาการป่วยชัดเจน
และตรวจ COVID-19 ผลลบ

ความรุนแรง
ของอาการ

ไม่
รุนแรง

รุนแรง

รับไว้รักษาใน
โรงพยาบาล

ฟอกเลือดในห้องแยก

มี

มีห้องแยก
เฉพาะ?

ไม่มี

แยกที่ฟอกเลือดไว้ปลายทางเดินน้ำ และ
ห่างจากผู้ป่วยอย่างน้อย 2 เมตร และ
ฟอกเป็นรอบสุดท้ายของวัน


บุคลากรสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม:

- 1) ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโดยตรงในระยะ 2 เมตร:
 - ชุดกาวน์กันน้ำ
 - หน้ากากอนามัยหรือ N95
 - หน้ากากป้องกันหน้า
- 2) ผู้ที่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง ให้ใช้:
 - ชุดกาวน์
 - หน้ากากอนามัย
 - หน้ากากป้องกันหน้า

แนวทางการฟอกเลือดในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่ไม่มีอาการ



20 มีนาคม 2563



ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีอาการ ต้องมีการตรวจติดตามอาการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 14 วัน
ถ้ามีอาการให้ส่งตรวจคัดกรอง COVID-19 ซ้ำ

แยกที่ฟอกเลือดไว้ปลายทางเดินน้ำ และห่างจากผู้ป่วยอย่างน้อย 2 เมตร และฟอกเป็นรอบสุดท้ายของวัน

เฝ้าระวังป้องกันถ่ายทอดการติดเชื้อ (transmission-based precautions):
1) ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโดยตรงในระยะ 2 เมตร:
- ชุดกาวน์
- หน้ากากอนามัย
- หน้ากากป้องกันหน้า
2) ผู้ที่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง ให้ใช้:
- ชุดกาวน์
- หน้ากากอนามัย
- หน้ากากป้องกันหน้า